


Choix du pansement en fonction du stade de l'escarre					
S T A D E	THERAPEUTIQUES				
	STADE	PRODUIT	SPECIALITE DISPONIBLE A L'HLSGV	INFO	RENOUVELLEMENT
	Peau saine ou rougeur réversible	Huile	Sanyrène	Massage circulaire par affleurement à mains nues. Une pulvérisation par point	4 fois/jour jusqu'à pénétration du produit
	1 Rougeur persistante	Film de polyuréthane Ou Hydrocolloïde mince	Tégaderm Algoplaque film	Appliquer en lissant du centre vers les bords sans étirer Ne pas masser	4 à 6 jours 1 semaine maximum Le plus longtemps possible
S T A D E 2	Phlyctène ou désépidermisation 	Hydrocolloïde mince Peau fragile	Algoplaque film Urgotul	Ne pas pratiquer de massage Ne pas l'inciser (percer avec aiguille stérile si liquide à évacuer)	4 à 6 jours 1 semaine maximum
	Appui sur rougeur persistante	Hydrocolloïde de type plaque mousse	Algoplaque HP		4 à 6 jours 1 semaine maximum

Si détérioration malgré les soins, passage aux soins curatifs

CURATIF

PLAIE NOIRE, STADE DE NECROSE



www.escarre.fr

S T A D E 3	STADE	PRODUIT	SPECIALITE	INFO	RENOUVELLEMENT
		Hydrogel + Hydrocolloïde mince transparent	Urgo- Hydrogel + Algoplaque Film	Gel en couche de 0.5cm d'épaisseur sans dépasser le pourtour de la plaie	A saturation de la plaque

PLAIE JAUNE, STADE DE DETERSION



S T A D E 4		PRODUIT	SPECIALITE DISPONIBLE A L'HLSGV	INFO	RENOUVELLEMENT
	Exsudats modérés	Hydrocolloïde opaque	Algoplaque	Si plaie creusée : Algoplaque Pate + pansement	3 à 7 jours (en fonction de la localisation)
	Exsudats abondants Et/ou Plaie hémorragique	Alginate	Urgosorb	Pansement secondaire nécessaire	1 à 2 jours
	Malodorante et exsudative +/- infectée	Alginate + pansement au charbon	Urgosorb + Actisorb Ag		1 à 2 jours

PLAIE ROUGE, STADE DE BOURGEONNEMENT



Exsudats modérés	Hydrocolloïde opaque	Algoplaque	Si plaie creusée : Algoplaque Pate + pansement	3 à 7 jours
Exsudats abondants	Hydrocellulaire	Allevyn Talon : Allevyn Heel Sacrum : Allevyn sacrum Cellosorb		1 à 2 jours A saturation (jusqu'à 7 jours) 2 à 4 jours
Exsudats très abondants	Alginate	Urgosorb		
Hyper bourgeonnement	Tulle	Jelonet+diprosone		1 à 2 jours

PLAIE ROSE, STADE D'EPIDERMISATION

Pas d'exsudats ou exsudats modérés Peau saine	Hydrocolloïde mince transparent Ou Film de polyuréthane	Algoplaque film Ou Opsite, tegaderm		3 à 4 jours
Peau altérée	Interface Tulle	Urgotul		2 à 4 jours
Exsudats abondants	Hydrocellulaire	Allevyn non adhesive Cellosorb Lite		A saturation (jusqu'à 7 jours) 3 à 5 jours