



Composition de la trousse d'urgence

Pochettes latérales

Première pochette : matériel pour injections

Aiguilles S.C., I.V. et I.M. + seringues 2, 10 ml

Deuxième pochette : matériel pour intubation

Sondes d'intubation taille 7 et 8, pince de Magill,

Troisième pochette : ciseaux, matériel pour pansements, gants et divers

Compresses et tampons stériles, sparadrap, ciseaux, gants stériles, vaseline

A l'intérieur de la trousse

Petite boîte jaune pour évacuation des objets à risque infectieux, gants non stériles (6)

Stérillium (solution hydroalcoolique pour l'antisepsie des mains)

Bétadine dermique

Pochettes rouges : matériel pour perfusion

Gélofusine (Plasmion), Chlorure de sodium 0,9 % poche 500ml, garrot

Cathéters taille 16, 18 20 et 22 (2), Tubulures trois voies (2), Films adhésifs stériles (3),.

Pochette verte : Insufflateur à usage unique + masque (type AMBU®)

Pochette rouge et bleue : matériel pour intubation

Laryngoscope et 3 lames, bande élastique, épingle à nourrice, Xylocaïne nébuliseur + embouts, seringue.

Pochette bleue : matériel pour examen

Tensiomètre, stéthoscope, marteau à réflexes, lampe de poche.

Pochette transparente

Canules de Guedel à usage unique (3 tailles), canule de trachéotomie, bistouri, Peak-flow.

Valisette jaune : médicaments

Côté gauche

Magnésium sulfate 10 % inj. (1)

Méthergin 0,2 mg/ml inj (1) (réfrigérateur guichet pharmacie)

Nalone (Naloxone = Narcan®) 0,4mg inj. (4)

Polaramine 5 mg inj. (2)

Primpéran inj.(2)

Perfalgan 1 gr inj. (paracétamol) (2)

Rivotril inj. (2)

Solumédrol 40 mg inj. (3)

Spasfon inj. (2)

Ventoline susp. inh. doseur (1)

Viscéralgine inj. (2)

Voltaire 75 mg inj. (2)

Xylocaïne 1 % inj (1)

Dans la pochette :

Nalbuphine 20 mg inj. (2) = Nubain

Adrénaline 1 mg inj. (5)

Atropine 1 mg inj.(2)

Côté droit

Anexate 1 mg inj. (2)

Atarax 100 mg inj. (2)

Bricanyl 0,5 mg inj. S.C (3)

Calcium 10 % inj. 10 ml (2)

Digoxine inj. (remplace Cédilanide inj.) (2)

Eau P.P.I. 10 ml (5)

Glucose 30 % inj. 10 ml (3) + canule intrarectale

Lasilix 20 mg inj. (5)

Loxapac 50 mg inj (2)

Loxen 20 mg cpr. (2)

Loxen 10 mg inj. (2)

Natispray 0,30 spray (trinitrine) (1)

Valium inj. (2) + **canule intrarectale**

Faire immédiatement compléter la trousse après chaque utilisation (ordonnance)